

【パス名】	内視鏡的胃瘻造設術 (IVHしていた場合)				科名	消化器内科	病舎名					
患者氏名	□ 様			年齢	歳	性別	男・女	主治医				
担当看護師				担当PT/OT								
目標	胃瘻造設に対し、患者・家族が理解し同意している。合併症を引き起こさず退院することができる。											
経過	術前チェック	月 日 (曜日)			月 日 (曜日)							
		術前 (前日までに) 入院時間 (:)			術前 (当日)		術後 (当日)					
目標	治療内容を理解し、精神的・身体的に問題なく治療が受けられる。			腹痛、出血等のトラブルなく経過する。								
検査・処置	PEG挿予約 腹部エコー予約 腹部CT予約 上部消化管内視鏡検査予約			CBC 生化学 凝固 (PT、APTT) 出血時間 感染症 血型 咽頭培養 胸部X線 腹部X線 上部消化管内視鏡検査 腹部エコー or/and 腹部CT			浣腸 (必要に応じて) 口腔ケア					
食事	入院時指示食 () 糖尿病 (有・無) 心疾患 (有・無) 高血圧 (有・無) 腎臓病 (有・無) その他の疾患 (有・無)			絶食			絶飲食		絶食 (夕より必要な内服薬のみ注入可)			
観察	入院時	転倒リスク () 点 褥創リスク評価 活動性 点 可動性 点 知覚の認知 点 観察のポイント 自覚症状 腹痛・腹満 心窩部痛・嘔気・呼吸苦・吐下血 バイタル 血圧・脈拍・体温	入院時	体温	入室時	帰室時	4時間後	眼前	準夜帯 (必要時)	準夜帯 (必要時)		
	身長 (cm) 体重 (kg) 腹部手術既往 (有・無) 開口障害 (有・無) 腹水 (有・無) 不隠 (有・無)		血圧								脈拍	体温
注射・内服	常用薬 (無・有) 抗凝固薬・抗血小板薬 (無・有 (中止 (/))) 屯用指示 発熱時 以上 ボルタレン坐薬 () mg 胸痛時 ソセゴン A筋注 腹痛時 ブスコパン A筋注 ソセゴン A筋注 嘔気、嘔吐時 プリンペラン A筋注 血圧 mmHg以上 アダラートL () 1T 内服 血圧 mmHg以下 吐血、下血時 Dr call			常用薬記載 内服 朝 昼 夕 眼前 現在のIVH/24h			常用薬内服 (可・不可) (必要な内服は下記に記載) 内服 朝 昼 現在のIVH/24h 下記を加注 アドナ (100mg) 1A トランサミン (1g) 1A ガスター (20mg) 1A ドルミカム 1A +生食 (20) 1A 持参 ソセゴン 1A 持参			夕より内服薬再開 (抗凝固薬を除く) 常用薬内服 夕 眼前 側管 セファメジン キット 1g x 2回 帰室後 眼前		
活動	フリー 入浴可			フリー 入浴不可			ベット上安静 入浴不可					
説明	入院診療計画書の説明 検査オリ 病棟オリエンテーション											
その他	内視鏡検査同意書 PEG同意書 抗生物質問診表			同意書確認 (Ns) IDカード 入院手続き○内服レベル ()			ストレッチャーの準備 内服レベル ()					
バリアンス	無 ・ 有			無 ・ 有			無 ・ 有					
看護				#1 体液平衡異常リスク状態 R/T 観血的処置 【成果目標値】 1. 体液バランス () 1極度に障害 2 かなりの障害 3 中程度に障害 4 軽度に障害 5 障害なし 2. 組織循環：腹部臓器 () 1 重度 2 強度 3 中程度 4 軽度 5 なし 3. 知識：治療処置 () 1 なし 2 限定的 3 中程度 4 かなりの程度 5 十分 【成果指標】 1. 体液バランス () 血圧 () Ht () 血清電解質 () 2. 組織循環：腹部臓器 () 嘔気 () 嘔吐 () 腹痛 () 3. 知識：治療処置 () 治療処置についての説明 () 処置に伴う制限についての説明 () 【アセスメント】術後、合併症を起こさず経過できるよう早期観察、対応が必要である 【看護介入】バイタルサインモニタリング 【看護活動】 0) バイタルサイン 腹部状態 検査データ T) 対症看護 E) 症状の報告 カンファレンス参加者								
署名	外来Dr	外来Ns	Dr.	日勤	準夜	Dr.	深夜	日勤	準夜			

【氏名】	内視鏡的胃瘻造設術（IVHしていた場合）										科名	消化器内科			病舎名	
患者氏名	□ 様				年齢				性別	男・女		主治医				
担当看護師					担当PT/OT											
目標	合併症引き起すことなく退院することができる。															
	月 日（ 曜日）			月 日（ 曜日）			月 日（ 曜日）			月 日（ 曜日）						
経過	術後1日目			術後2日目			術後3日目			術後4日目						
目標	腹痛、出血、創部感染等のトラブルなく経過する。															
検査・処置	○採血（至急） CBC 生化 胃瘻部消毒・洗浄 半抜糸 （全抜糸は7日前後を目安に行う） カテーテルを回転させる（1回/日） B.B															
食事	内服薬のみ注入可			内服薬のみ注入可			内服薬のみ注入可			内服薬のみ注入可						
観察	深夜	日勤	準夜	深夜	日勤	準夜	深夜	日勤	準夜	深夜	日勤	準夜	深夜	日勤	準夜	
	体温															
	血圧															
	脈拍															
	腹痛の有無															
	胃瘻部の状態															
	便性状															
	(その他記載)				(その他記載)			(その他記載)			(その他記載)					
注射・内服	内服薬						抗凝固薬再開									
常用薬	常用薬内服 朝 昼 夕 眠前			常用薬内服 朝 昼 夕 眠前			常用薬内服 朝 昼 夕 眠前			常用薬内服 朝 昼 夕 眠前						
	現在のIVH/24h			現在のIVH/24h			現在のIVH/24h			現在のIVH/24h						
	側管 セファメジン キット 1g×2回 朝 夕															
活動	主治医の診察後、トイレ歩行のみ可 入浴不可			病棟内フリー			院内フリー									
説明																
その他	内服レベル（ ）			内服レベル（ ）			内服レベル（ ）			内服レベル（ ）						
バリアンス	無 ・ 有			無 ・ 有			無 ・ 有			無 ・ 有						
看護																
署名	Dr.	深夜	日勤	準夜	Dr.	深夜	日勤	準夜	Dr.	深夜	日勤	準夜	Dr.	深夜	日勤	準夜

【パス名】	内視鏡的胃瘻造設術 (IVHしていた場合)				科名	消化器内科			病舎名									
患者氏名	□□ 様			年齢	歳	性別	男・女		主治医									
担当看護師				担当PT/OT														
目 標	合併症引き起こさず退院することができる。																	
	月 日 (曜日)	月 日 (曜日)	月 日 (曜日)	月 日 (曜日)	月 日 (曜日)	月 日 (曜日)	月 日 (曜日)	月 日 (曜日)	月 日 (曜日)	月 日 (曜日)								
経 過	術後5日目		術後6日目		術後7日目		術後8日目		術後9日目									
目 標	腹痛、出血、創部感染等のトラブルなく経過する。																	
検査・処置	胃瘻部消毒・洗浄			カテーテルを回転させる (1回/日) B.B			全抜糸 (低栄養状態の場合は14日前後を目安に行う)			胃瘻周囲の皮膚は微温湯と石けんで洗う								
食 事	昼：微温湯200ml (嘔吐、下痢などの症状が出たら、2段階前のところへ戻って再度ステップアップ)			朝：微温湯200ml 夕：栄養剤100ml (*1kcal/mlとして) + 微温湯200ml			朝：栄養剤100ml + 微温湯200ml 昼：栄養剤100ml + 微温湯200ml			朝：微温湯200ml 昼：栄養剤200ml 夕：微温湯200ml								
観 察	深夜	日 勤	準 夜	深夜	日 勤	準 夜	深夜	日 勤	準 夜	深夜	日 勤	準 夜	深夜	日 勤	準 夜			
体温																		
血 圧																		
脈 拍																		
腹痛の有無																		
胃瘻部の状態																		
便性状																		
	(その他記載)			(その他記載)			(その他記載)			(その他記載)			(その他記載)					
注射・内服	内服薬																	
常用薬	内服 朝 昼 夕 眼前			内服 朝 昼 夕 眼前			内服 朝 昼 夕 眼前			内服 朝 昼 夕 眼前			内服 朝 昼 夕 眼前					
	現在のIVH/24h			以後主治医の指示のもとIVH減量			IVH減量			IVH減量			IVH減量					
活 動	フリー 入浴不可									全抜糸翌日よりシャワー可			全抜糸翌日よりシャワー可					
説 明																		
その他	内服レベル ()			内服レベル ()			内服レベル ()			内服レベル ()			内服レベル ()					
バリエーション	無 ・ 有			無 ・ 有			無 ・ 有			無 ・ 有			無 ・ 有					
看 護																		
署 名	Dr.	深夜	日勤	Dr.	深夜	日勤	準夜	Dr.	深夜	日勤	Dr.	深夜	日勤	準夜	Dr.	深夜	日勤	準夜

氏名	内視鏡的胃瘻造設術 (IVHしていた場合)										科名	消化器内科			病舎名			
患者氏名	□ 様										年齢	歳	性別	男・女	主治医			
担当看護師											担当PT/OT							
目標	合併症引き起こすことなく退院することができる。																	
経過	月 日 (曜日)			月 日 (曜日)			月 日 (曜日)			月 日 (曜日)			月 日 (曜日)					
	術後10日目			術後11日目			術後12日目			術後13日目			術後14日目					
目標	腹痛、出血、創部感染等のトラブルなく経過する。																	
検査・処置	胃瘻周囲の皮膚は微温湯と石けんで洗う カテーテルを回転させる (1回/日) B.B																	
食事	朝：栄養剤200ml + 微温湯100ml 昼：栄養剤200ml + 微温湯100ml 夕：栄養剤200ml + 微温湯100ml			朝：栄養剤400ml 昼：栄養剤200ml + 微温湯200ml 夕：栄養剤400ml			朝：栄養剤400ml 昼：栄養剤200ml + 微温湯200ml 夕：栄養剤400ml			朝：栄養剤400ml + 微温湯50ml 昼：栄養剤400ml + 微温湯50ml 夕：栄養剤400ml + 微温湯50ml			朝：栄養剤400ml + 微温湯50ml 昼：栄養剤400ml + 微温湯50ml 夕：栄養剤400ml + 微温湯50ml					
	深夜	日勤	準夜	深夜	日勤	準夜	深夜	日勤	準夜	深夜	日勤	準夜	深夜	日勤	準夜			
体温																		
血圧																		
脈拍																		
腹痛の有無																		
胃瘻部の状態																		
便性状																		
	(その他記載)			(その他記載)			(その他記載)			(その他記載)			(その他記載)					
注射・内服	内服薬 常用薬 内服 朝 昼 夕 眠前 主治医の指示のもとIVH中止																	
活動	フリー シャワー可 → 入浴可(周囲の感染なければ)																	
説明																		
その他	内服レベル ()			内服レベル ()			内服レベル ()			内服レベル ()			内服レベル ()					
バランス	無 ・ 有			無 ・ 有			無 ・ 有			無 ・ 有			無 ・ 有					
看護																		
署名	Dr.	深夜	日勤	Dr.	深夜	日勤	準夜	Dr.	深夜	日勤	Dr.	深夜	日勤	準夜	Dr.	深夜	日勤	準夜